

101 年院內感染管制及傳染病教育訓練課程考題

日期：101 年 6 月 9 日(星期六)

講題：手術室術前、術中及術後之感染管制

Monkeypox

服務機構：

職稱：

姓名：

(請正楷填寫以便確認，謝謝。)

(※注意：請直接將答案書寫在考卷上，本試卷共有 2 頁。)

- | 答案 | 題號 | 題目 |
|-----|----|---|
| (C) | 1 | 週邊靜脈插管可放幾天？ (A) 1-2 天 (B) 1-2 週 (C) 2-4 天 (D) 2-4 週 (E) 5-7 天 |
| (B) | 2 | 術前給病人洗無菌澡的確定效果為何？ (A) 降低傷口感染率 (B) 降低皮膚細菌數 (C) 降低手術併發症 (D) 降低住院天數 (E) 降低住院費用 |
| (C) | 3 | 何者非為維持無菌區域之必要條件？ (A) 不要遠離無菌區操作 (B) 換位置時“背對背”“胸對胸”原則 (C) 手臂放於腰部以上，身體旁邊 (D) 手術衣的無菌區域：身體前方胸部到手術區域，手臂為肘上 2 英寸到袖口 2 英寸 (E) 非無菌操作人員要面對無菌操作人員 |
| (E) | 4 | 開刀巾(手術薄膜)的品質，何者為正確？ (A) 不含碘手術薄膜可降低 SSI (B) 有黏性但含碘的手術薄膜反而升高 SSI 的風險 (C) 沒黏性但含碘的手術薄膜反而升高 SSI 的風險 (D) 沒黏性但不含碘的手術薄膜反而升高 SSI 的風險 (E) 有黏性但不含碘的手術薄膜反而升高 SSI 的風險 |
| (E) | 5 | 手術室環境控制中何者為非？ (A) 限制手術室內人員流動 (B) 除了必要的人員、物品流動，門要保持關閉 (C) 室內溫度保持在 20°C 到 23°C (68 度 F 到 73 度 F) (D) 相對濕度 30% 到 60% (E) 室內保持正壓空氣流通要至少 6 次/小時 |
| (C) | 6 | 猴痘與天花最大的臨床差別在於： (A) 白血球增高 (B) 不發燒 (C) 淋巴結腫 (D) 只感染猴類 (E) 會痊癒 |
| (C) | 7 | 猴痘死亡最高風險族群為何？ (A) 壯年人 (B) 孕婦 (C) 15 歲以下之小孩 (D) 65 歲以上的老人 |

- (E) 新生兒
- (A) 8 得到猴痘之最大風險為何？
(A) 接觸動物 (B) 接觸病人 (C) 接觸環境 (D) 食物 (E) 院內感染
- (D) 9 何種動物可傳播猴痘？
(A) 台灣獼猴 (B) 非洲綠猴 (C) 恆河猴 (D) 大鼠 (E) 黑猩猩
- (C) 10 猴痘病毒屬於：
(A) poxvirus (B) parapoxvirus (C) orthopoxvirus (D) peripoxvirus
(E) monkeypoxvirus