

101 年院內感染管制及傳染病教育訓練課程考題

日期：101 年 9 月 15 日(星期六)

講題：母乳對嬰兒傳染病防治之效益評估

產房之感染管制

服務機構：

職稱：

姓名：

(請正楷填寫以便確認，謝謝。)

(※注意：請直接將答案書寫在考卷上，本試卷共有 1 頁。)

- | 答案 | 題號 | 題目 |
|-----|----|--|
| (E) | 1 | 母乳能降低新生兒死亡率多少倍？
(A) 沒下降 (B) 10 倍 (C) 20 倍 (D) 2 倍 (E) 3-5 倍 |
| (E) | 2 | 母體抗體掉到無保護力約在何時？
(A) 0-22 週 (B) 2-4 週 (C) 4-6 週 (D) 6-8 週 (E) 8-12 週 |
| (E) | 3 | 母乳不能防止新生兒何種疾病？
(A) 上呼吸道感染 (B) 下呼吸道感染 (C) 中耳炎 (D) 腦膜炎
(E) 心肌炎 |
| (A) | 4 | 完全不用母乳及完全用六個月母乳對新生兒中耳炎可降低幾倍？
(A) 2 倍 (B) 4 倍 (C) 6 倍 (D) 8 倍 (E) 10 倍 |
| (B) | 5 | 完全哺育母乳最少應多久？
(A) 2 個月 (B) 4 個月 (C) 6 個月 (D) 10 個月 (E) 1 年 |
| (D) | 6 | 何者為產房的半管制區？
(A) 產台 (B) 手術室 (C) 產房 (D) 外走廊 (E) 以上全是管制區 |
| (D) | 7 | 病人家屬可否進產房？
(A) 可以 (B) 不可以 (C) 可以，但必須傳合適的產房隔離衣 (D)
可以，但必須與外科醫師穿的一樣 (E) 要由醫師陪同才可進入 |
| (E) | 8 | Vaginal delivery packs 打開後不得超過多久就要使用？
(A) 2 小時 (B) 4 小時 (C) 6 小時 (D) 8 小時 (E) 12 小時 |
| (D) | 9 | 剖腹產包打開後不得超過多少時間？
(A) 2 小時 (B) 4 小時 (C) 6 小時 (D) 8 小時 (E) 12 小時 |
| (C) | 10 | 產房後門的功能為何？
(A) 病患緊急出口 (B) 病患緊急入口 (C) 廢棄物出口 (D) 廢棄
物入口 (E) 工作人員出入口 |