

中華民國 102 年傳染病及院內感染管制教育訓練課程考題

日期：102 年 8 月 3 日(星期六)

講題：SSPE

體溫控制對手術傷口感染之影響  
評估

狂犬病

服務機構：

職稱：

姓名：

(請正楷填寫以便確認，謝謝。)

(※注意：請直接將答案書寫在考卷上，本試卷共有 2 頁。)

答案 題號

題目

- ( ) 1 術中低體溫是指 core temperature 為何？  
(A) 37°C 以下 (B) 36.5°C 以下 (C) 36°C 以下 (D) 35.5°C 以下 (E) 35°C 以下
- ( ) 2 何者不是低體溫的風險因子？  
(A) 老年 (B) 小孩 (C) 全身麻醉 (D) 麻醉時間>30 分鐘 (E) 高血糖
- ( ) 3 何者可有效防止術中低體溫？  
(A) Airway heating (B) Bair hugger (C) Warming blood transfusion (D) hot water container (E) 電毯
- ( ) 4 1 liter 的輸液可降低 core temperature 多少度？  
(A) 1°C (B) 0.5°C (C) 0.25°C (D) 0.2°C (E) 0.1°C
- ( ) 5 何者用以量 core temperature ？  
(A) 口溫 (B) 腋溫 (C) 肛溫 (D) 肺靜脈 (E) 口咽
- ( ) 6 麻疹病毒是何種病毒？  
(A) 麗莎病毒 (B) 黏液病毒 (C) 副黏液病毒 (D) 腺病毒 (E) 腸病毒
- ( ) 7 麻疹病毒有多少血清型？  
(A) 1 種 (B) 7 種 (C) 12 種 (D) >100 種 (E) 25 種
- ( ) 8 麻疹出現腦炎的比例？  
(A) 1% (B) 0.1% (C) 0.01% (D) 萬分之一 (E) 十萬分之一
- ( ) 9 SSPE 之產生風險因子為何？  
(A) 打過麻疹疫苗 (B) 沒打過麻疹疫苗 (C) 打過二劑麻疹疫苗 (D) 得過麻疹 (E) 年紀較大才得麻疹

- ( ) 10 SSPE 的比例何者最接近？  
(A) 1% (B) 0.1% (C) 十萬分之一 (D) 千萬分之一 (E) 萬分之一
- ( ) 11 被何種野生動物咬傷不必懷疑會得狂犬病？  
(A) 狼 (B) 浣熊 (C) 臭鼬 (D) 松鼠 (E) 白鼻心
- ( ) 12 狂犬病暴露後疫苗施打應打幾劑？  
(A) 1 劑 (B) 2 劑 (C) 3 劑 (D) 4 劑 (E) 5 劑
- ( ) 13 狂犬病免疫球蛋白在第一劑疫苗施打後多久內仍有效？  
(A) 疫苗施打後都沒效 (B) 不可和疫苗同時打 (C) 疫苗打後 3 日內仍有效 (D) 疫苗打後 7 日內仍有效 (E) 疫苗打後 14 日內仍有效
- ( ) 14 何種動物咬傷的狂犬病最輕？  
(A) 狼 (B) 狗 (C) 貓 (D) 蝙蝠 (E) 浣熊
- ( ) 15 狂犬病患者不會表現何種神經學症狀？  
(A) 恐水症 (B) 抽筋 (C) 昏迷 (D) 軟癱 (E) 全部都會