

中華民國 103 年傳染病及院內感染管制教育訓練課程考題

日期：103 年 5 月 10 日(星期六)

講題：愛滋產婦母乳哺育之安全性分析、
帶狀皰疹疫苗

服務機構：

職稱：

姓名：

(請正楷填寫以便確認，謝謝。)

(※注意：請直接將答案書寫在考卷上，本試卷共有 1 頁。)

- | 答案 | 題號 | 題目 |
|-----|----|---|
| (B) | 1 | 愛滋媽媽產後 6 個月完全母乳哺育傳染嬰兒愛滋的機會為何？
(A) 0 (B) 4% (C) 10% (D) 20% (E) 50% |
| (A) | 2 | 愛滋媽媽母乳哺育傳染嬰兒愛滋的機會平均每月多少？
(A) 1% (B) 2% (C) 3% (D) 4% (E) 5% |
| (E) | 3 | 依據南非的經驗何種嬰兒哺育方式有最高的愛滋感染率？
(A) 完全母乳 (B) 母乳與奶粉混搭 (C) 完全牛乳 (D) 完全固態食物 (E) 母乳與固態食物混搭 |
| (C) | 4 | 何種嬰兒哺育方式嬰兒有最高的感染死亡率？
(A) 完全母乳 (B) 母乳與奶粉混搭 (C) 完全牛乳 (D) 完全固態食物 (E) 母乳與固態食物混搭 |
| (C) | 5 | 愛滋媽媽若要決定以母乳以外的方式哺育，應先進行何種評估？
(A) FABS (B) AFAS (C) FAAS (D) AFASS (E) SKSS |
| (C) | 6 | 人類水痘病毒感染後潛藏於何處？
(A) 大腦 (B) 脊髓 (C) 感覺神經結 (D) 運動神經結 (E) 皮下組織 |
| (D) | 7 | 水痘病毒感染後抗體約需多少年開始大幅下降？
(A) 10 年 (B) 20 年 (C) 30 年 (D) 40 年 (E) 終生不降 |
| (A) | 8 | 帶狀皰疹疫苗不適宜施打在何種病人身上？
(A) 愛滋病人 (B) 老人 (C) 化療前的病人 (D) 化療後的病人 (E) 結核病人 |
| (D) | 9 | 帶狀皰疹疫苗的病毒量是水痘疫苗病毒量的多少倍？
(A) 1 倍 (B) 2 倍 (C) 10 倍 (D) 14 倍 (E) 17 倍 |
| (B) | 10 | 台灣人終其一生罹患帶狀皰疹的比例為何？
(A) 二分之一 (B) 三分之一 (C) 四分之一 (D) 五分之一 (E) 100% |