

中華民國 104 年傳染病及院內感染管制教育訓練課程考題

日期：104 年 01 月 17 日(星期六)
講題：愛滋母子垂直感染之預防性投藥
與抗藥性問題、
外科蓋單、敷料與病人安全

服務機構：
職稱：
姓名：
(請正楷填寫以便確認，謝謝。)

(※注意：請直接將答案書寫在考卷上，本試卷共有 2 頁。)

- | 答案 | 題號 | 題目 |
|-----|----|---|
| (B) | 1 | 愛滋母子垂直感染最常出現在何種時期？
(a) in utero (b) intrapartum (c) postpartum (d) 哺乳 (e) sexual contact |
| (E) | 2 | MTCT 的風險因子，核者為非？
(a) Viral load (b) mother CD4 (c) STI (d) mode of delivery (e) bottle feeding |
| (C) | 3 | 最有利於 HIV、MTCT 的哺乳方式為何？
(a) formula fed (b) exclusive breast fed (c) mixed fed (d) no milk fed (e) regular food |
| (B) | 4 | 以 Nevirapine 作孕婦預防性投藥之效益，何者為正確？
(a) 第一胎效果優於第二胎 (b) 第一胎與第二胎效用一樣 (c) 第二胎明顯效果優於第一胎 (d) 第三胎效果優於第一胎 (e) 第一胎效果優於第三胎 |
| (C) | 5 | 如何減少單次 Nevirapine 預防性投藥而產生抗藥性之疑慮？
(a) 禁用 (b) 用一週 (c) 初始聯合 3TC (c) HAART (d) 母子同時投藥 |
| (C) | 6 | 外科蓋單材料的要求，何者為非？
(a) 能阻擋微生物 (b) 防血、防水 (C) 不透氣 (d) 保持體溫 (e) 防靜電 |
| (A) | 7 | 單次使用的蓋單缺點為何？
(a) 環境汙染 (b) 安全 (c) 阻絕效果不理想 (d) 會起毛球 (e) 易著火 |
| (D) | 8 | 切口周圍多少距離為 critical zone？
(a) 3 英寸 (b) 6 英寸 (c) 9 英寸 (d) 12 英寸 (e) 15 英寸 |
| (B) | 9 | 最好的手術薄膜為何？
(a) 不含消毒劑 (b) 含碘 (c) 含黏膠 (d) 含水 (e) 含銀 |
| (C) | 10 | 蓋單的摺法應為？ |

(a) 對摺 (b) 反摺 (c) 扇摺 (d) 不摺 (e) 八分摺