

中華民國 104 年傳染病及院內感染管制教育訓練課程考題

日期：104 年 04 月 18 日(星期六)

講題：阿米巴腦膜腦炎、

Controversies in Prevention of
Surgical Site Infections

服務機構：

職稱：

姓名：

(請正楷填寫以便確認，謝謝。)

(※注意：請直接將答案書寫在考卷上，本試卷共有 1 頁。)

- | 答案 | 題號 | 題目 |
|-----|----|---|
| (C) | 1 | 阿米巴腦膜腦炎最大風險行為為何？
(A) 肛交 (B) 靜脈毒癮 (C) 游泳 (D) 吸菸 (E) 服用類固醇 |
| (E) | 2 | 阿米巴腦膜腦炎的死亡率為何？
(A) 10% (B) 20% (C) 30% (D) 50% (E) 將近 100% |
| (C) | 3 | <i>Naegleria fowleri</i> 腦膜腦炎的治療藥物為何？
(A) metronidazole (B) fluconazole (C) amphotericin B (D) itraconazole (E) baktar |
| (A) | 4 | GAE 腦炎，阿米巴菌來自何種途徑？
(A) 血行 (B) 接觸 (C) 飛沫 (D) 性傳染 (E) 糞口傳染 |
| (E) | 5 | GAE 的治療藥物為何？
(A) metronidazole (B) fluconazole (C) amphotericin B (D) itraconazole (E) sulfamethazine |
| (D) | 6 | 心胸外科手術，有糖尿病病人的傷口感染率為沒有糖尿病病人的傷口感染率的幾倍？
(A) 一樣 (B) 二倍 (C) 三倍 (D) 四倍 (E) 五倍 |
| (A) | 7 | Antiseptic shower 可否降低傷口感染率？
(A) 沒有降低 (B) 降低二倍 (C) 降低 20% (D) 降低 30% (E) 降低 40% |
| (A) | 8 | Mechanical bowel preparation 是否可降低一般外科傷口感染率？
(A) 沒有降低 (B) 降低二倍 (C) 降低 20% (D) 降低 30% (E) 降低 40% |
| (E) | 9 | Oral antibiotics bowel preparation 對大腸直腸手術的傷口感染率可否較低？
(A) 沒有降低 (B) 降低 10% (C) 降低 20% (D) 降低 30% (E) 降低 50% |
| (B) | 10 | 每輸一袋血可增加 ICU 多少感染風險？
(A) 1 倍 (B) 1.5 倍 (C) 2 倍 (D) 3 倍 (E) 4 倍 |