

中華民國 104 年傳染病及院內感染管制教育訓練課程考題

日期：104 年 09 月 05 日(星期六)

講題：Thyroiditis、

產房的感染控制

服務機構：

職稱：

姓名：

(請正楷填寫以便確認，謝謝。)

(※注意：請直接將答案書寫在考卷上，本試卷共有 1 頁。)

- | 答案  | 題號 | 題目   |
|-----|----|--|
| (A) | 1  | 急性甲狀腺炎的致病菌最常見的為何？<br>(A)細菌 (B)結核 (C)病毒 (D)黴菌 (E)自體免疫                 |
| (C) | 2  | 亞急性甲狀腺炎的致病菌最常見的為何？<br>(A)細菌 (B)結核 (C)病毒 (D)黴菌 (E)自體免疫                |
| (A) | 3  | 何種甲狀腺炎沒有甲狀腺機能亢進的表現<br>(A)急性 (B)亞急性(C)沉默型 (D)PPT (E)格雷夫氏症             |
| (A) | 4  | PPT 產後一年的發生率為何？<br>(A)1-16% (B)20% (C)30% (D)5-25% (E)3-20%          |
| (B) | 5  | 急性與亞急性甲狀腺炎最常見的症狀為？<br>(A)甲狀腺機能亢進 (B)前頸痛(C)產生甲狀腺抗體 (D)心跳加速<br>(E)心律不整 |
| (D) | 6  | 剖婦產的預防性抗生素何時給最好？<br>(A)劃刀前 (B)劃刀後 (C)夾臍帶前 (D)夾臍帶後 (E)不必用             |
| (E) | 7  | 陰道產的器械包打開後多久必須使用？<br>(A)1 小時 (B)2 小時 (C)4 小時 (D)8 小時 (E)12 小時        |
| (D) | 8  | 剖婦產的器械包打開後多久必須使用？<br>(A) 1 小時 (B)2 小時 (C)4 小時 (D)8 小時 (E)12 小時       |
| (C) | 9  | 產房後門應如何使用？<br>(A)運送垃圾 (B)家屬出入 (C)應予關閉 (D)病人出院 (E)醫護走道                |
| (A) | 10 | 冷凍切片的檢體應放置於何種檢體盒內？<br>(A)生理食鹽水 (B)蒸餾水 (C)福馬林 (D)乾盒子中 (E)酒精           |